



Εικόνα 61. Περιοχή μασχάλης μετά από επτά εφαρμογές IPL και ένα χρόνο έπειτα από την τελευταία εφαρμογή.

Χρησιμοποιήθηκε ipl στα 600-1200nm με απλό παλμό και εκπεμπόμενη ενέργεια στα $32\text{J}/\text{cm}^2$. Μετά από κάθε εφαρμογή που γινόταν σε μηνιαία βάση εμφάνιζε εγκαύματα Α' βαθμού τα οποία απέδραμαν από μόνα τους χωρίς καμμία απολύτως θεραπευτική αντιμετώπιση. Εδόθησαν μόνο οδηγίες για αποφυγή του ήλιου και λήψη νερού από το στόμα αφού η ενυδάτωση του δέρματος γίνεται κατά κύριο λόγο από εκεί.

Ένα χρόνο μετά τον Ιανουάριο του 2007 η τριχοφυΐα ελαττώθηκε σημαντικά μετά από δέκα σε μηνιαία βάση εφαρμογές. Η ασθενής επανέλαβε κατά την διάρκεια εκείνου του έτους τρεις επισκέψεις ανά δίμηνο μέχρι το καλοκαίρι του 2007.

Η τριχοφυΐα στις συγκεκριμένες περιοχές σχεδόν εξαφανίστηκε και το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε όπως παρατίθεται στις φωτογραφίες.



Εικόνα 62. Φωτογραφία κνημών επτά (7) χρόνια μετά την τελευταία εφαρμογή με ipl (έντονο παλμικό φως)